COMPLEJO DE ESCARABAJOS AMBROSIALES

Euwallacea spp.-Fusarium euwallaceae

Plaga exótica de importancia cuarentenaria originaria del Sudeste de Asia. En América se detectó por primera vez en el 2003 en el Estado de California, E.U. afectando árboles de falsa acacia (*Robinia pseudoacacia*) lychee (*Litchi chilensis*) y acer (*Acer negudo*). Hospeda 52 familias taxonómicas. La actividad de este insecto junto con su hongo simbionte *Fusarium euwallaceae* pone en riesgo la cobertura vegetal nacional, alterando los ecosistemas y sus servicios ambientales derivados.

Características generales

Insecto perteneciente a la subfamilia Scolytinae, presenta dimorfismo sexual y porta al hongo simbionte *Fusarium euwallacea*, considerado de alta patogenicidad. Los machos son poco comunes en las poblaciones, ya que presentan alas, ojos, y piezas bucales atrofiadas. Son insectos de talla pequeña, aproximadamente 1.5-2.5 mm de longitud y su cuerpo es color marrón. El declive elitral es aproximadamente dos tercios de la longitud de los élitros.



Síntomas de los hospedantes con afectación:

- Presencia de múltiples orificios de salida en el fuste. Cuando hay afectación por el hongo simbionte, éstos presentan coloración oscura.
- Muerte regresiva.
- Formación de galerías sinuosas en la albura.

Hospedantes

Dado que son mas de 200 especies, se reportan las familias con mayor impacto económico-ambiental:










Anacardiaceae, Apocynaceae, Arecaceae, Asteraceae, Bignoniaceae, Bombacaceae, Boraginaceae, burseraceae, Casuarinaceae, Ebenaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Hammamelidaceae, Juglandaceae, Lauraceae, Magnoliaceae, Meliaceae, Moraceae, Oleaceae, Onagraceae, Pinaceae, Platanaceae, Polygalaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Rutaceae, Salicaceae, Sapindaceae, Tiliaceae.





Alerta Temprana y Evaluación de Riesgo para Escarabajos Ambrosiales Exóticos Euwallacea sp.



Alerta Temprana y Evaluación de Riesgo para Escarabajos Ambrosiales Exóticos Euwallacea sp. Octubre-Diciembre 2025

Variables utilizadas:

- Proyecto del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR-2015-C01-265677 "Diagnóstico y potencial mitigación del impacto negativo para los bosques en México, por la invasión de los escarabajos ambrosiales Xyleborus glabratus y Euwallacea sp., y los hongos altamente patogénicos que estos insectos transmiten".
- Cobertura forestal de la Serie VII de Uso del Suelo y Vegetación (INEGI, 2018).
- Monitor de Sequía en México (CONAGUA, 2025).

Nivel de riesgo estatal

Riesgo		
Muy Alto	Alto	Moderado
Baja California	Sonora Chihuahua Durango Coahuila de Zaragoza Nuevo León Tamaulipas Jalisco Zacatecas San Luis Potosí Guerrero Oaxaca Campeche Quintana Roo	Baja California Sur Sinaloa Nayarit Aguascalientes Hidalgo Colima Michoacán de Ocampo Guanajuato Ciudad de México México Morelos Querétaro Tlaxcala Puebla Veracruz Ignacio de la Llave Chiapas Tabasco Yucatán





