

INSECTOS DEFOLIADORES

Los defoliadores son insectos que en su fase larval, o adulta, se alimentan del follaje de los árboles ocasionando una reducción de la superficie foliar, que dependiendo de su intensidad y la época de ocurrencia, puede traer como consecuencia el debilitamiento del arbolado lo que incrementa la vulnerabilidad de las masas forestales al ataque de otras plagas. Esta plaga afecta anualmente superficies de vegetación forestal en el País.

Características generales

Son insectos que se alimentan de las partes más suaves de las hojas dejando solo las venas o las partes más duras, las especies más importantes consumen la hoja entera. Los defoliadores de mayor relevancia a nivel nacional están en el orden Lepidóptera e Himenóptera.



Síntomas de los bosques con afectación por defoliadores

Disminución de más del 25 por ciento del follaje.

Cambio del color de la copa.

Presencia de gran cantidad de insectos o larvas alimentándose de las hojas o acículas.


El grado en el cual un árbol es dañado depende de lo extenso de la defoliación, estación del año y la frecuencia sucesiva de defoliadores.

Hospedantes

Pinus arizonica, *Pinus cembroides*, *Pinus douglasiana*, *Pinus engelmannii*, *Pinus maximinoi*, *Pinus oocarpa*, *Pinus patula*


Juniperus flaccida, *Quercus spp.*, *Cedrela odorata*, *Swietenia macrophylla*, *Tabebuia sp.*, *Tectona grandis*.

Superficie afectada por defoliador por Estado (Enero - Diciembre 2016)



Alerta Temprana y Evaluación de Riesgo para Insectos Defoliadores

Enero 2017



COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

COORDINACIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN

GERENCIA DE SANIDAD

Nivel de Riesgo

- Muy Alto
- Alto
- Moderado
- Bajo
- Muy Bajo

DATOS DEL SISTEMA DE REFERENCIA

Proyección: Cónica Conforme de Lambert
Datum: WGS84
Parámetros:
Falso Este: 2 500 000
Falso Norte: 0
Meridiano Central: -102
Paralelo Central: 12
1° Paralelo Estándar: 17.5
2° Paralelo Estándar: 29.5



ESCALA NUMÉRICA: 1:4.587.667

ESCALA GRÁFICA



ELABORO:
Gerencia de Sanidad
FUENTE:
A partir de diversos mapas cartográficos
CONABIO, CIA, CONAFOR, INEGI
Diciembre 2016

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
Paseo de la Reforma No. 5390
Col. San Juan de Ocotlán, C.P. 45019
Zapopan, Jalisco.
www.conafor.gob.mx

**ALERTA TEMPRANA Y EVALUACIÓN DE RIESGO
PARA INSECTOS DEFOLIADORES
ENERO 2017**

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA



CONABIO
COMISIÓN NACIONAL DE
AGRICULTURA, PECUARIO Y PESQUERÍA

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Análisis:

Tomando como referencia la información del Monitor de Sequía en México (SMN, 2016), incendios forestales (CONAFOR, 2016) y el registro de las notificaciones emitidas por SEMARNAT (SNGF, 2016) de afectación y brotes activos por insectos defoliadores durante el año 2016, se determina que las zonas forestales de los estados de **Oaxaca**, **Guerrero** y **Jalisco** presentan un nivel de riesgo **Muy Alto**; los estados de **Baja California**, **Sonora**, **Colima** y **San Luis Potosí** presentan áreas con riesgo **Alto**. Así también, los estados de **Chiapas** y **Michoacán** presentan riesgo **Moderado**. El resto de las Entidades Federativas que tienen superficie forestal de latifoliadas susceptible al ataque de defoliadores, se determinan con riesgo **Bajo** y muy **Bajo**.